

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współdziałaniu władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga**.



Komunikat sadowniczy SKS XIII 2013-06-14

PARCZ JABŁONI

Zalecamy kontynuowanie systematycznego (co 5-7 dni) zabezpieczania młodych przyrostów oraz zawiązków preparatami kontaktowymi (Delan, Kaptan).

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA

W ciągu najbliższych dni (najpóźniej do 18 czerwca) należy wykonać zabieg zwalczający owocówkę jabłkóweczkę w fazie „czarnej główki”. Należy zastosować jeden z poniższych produktów:

preparaty zwalczające owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki liściowe (produkty z tej grupy wykazują najdłuższe działanie na owocówkę i dlatego ich stosowanie jest najbardziej uzasadnione):

Coragen 200 SC w dawce 0,175 ml/ha

Runner 240 SC w dawce 0,4 l/ha

Steward 30 WG w dawce 0,2 kg/ha

Affirm 095 SG w dawce 2,5 kg/ha

lub preparaty zwalczające owocówkę jabłkóweczkę, zwójki liściowe, a także mszyce:

Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha

Mospilan 20 SP w dawce 0,2 kg/ha

Reldan 225 EC w dawce 2,25 l/ha (preparat nieselektywny)

względnie preparaty z grupy pyretroidów (zwalczają również mszyce, ale należy podkreślić, że nie są selektywne, a w wysokich temperaturach mają krótkotrwałe działanie):

Sherpa 100 EC w dawce 0,45 l/ha;

Fastac 100 EC w dawce 0,18 l/ha.

DOKARMIANIE DOLISTNE

Zalecamy zwrócić szczególną uwagę na dokarmianie dolistne drzew owocowych. Szczególnie w miejscach gdzie długo utrzymywała się woda (podtopienia) liście są w bardzo słabej kondycji. Liście i ich kondycja bezpośrednio wpływają na jakość owoców oraz ilość wiązanych pąków kwiatowych na następny sezon.

Aby poprawić jakość liści należy wykonać zabieg stosując mieszaninę produktu aminokwasowego oraz nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy preparaty:

Megafol w dawce 2,5 l/ha + **OptiMikro** w dawce 2-3 kg/ha.

Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.

W przypadku jabłoni i gruszy zalecamy również zastosować dodatkowy zabieg nawozem zawierającym magnez oraz azot np. **FruitAkademia na wzrost owoców I** w dawce 8 kg/ha.

OGRANICZANIE OPADANIA LIŚCI NA ODMIANIE GOLDEN DELICIOUS

W obecnym sezonie na odmianie Golden Delicious oraz na części odmian od niej pochodzących można zaobserwować wyjątkowo silny opad liści (tzw. opadziwa). Specyficzne warunki pogodowe w tym sezonie sprzyjały nasileniu tego zjawiska. Preparaty zawierające **mankozeb** wyraźnie wpływają na ograniczenie opadania liści (2 – 3 zabiegi). Również dodatkowe zabiegi dolistne preparatami zawierającymi magnez oraz mangan wpływają na ograniczenie tego zjawiska. Zalecamy zastosować co najmniej dwa zabiegi jednym z nawozów:

OptiMikro w dawce 5 kg/ha

Magnitech w dawce 5 l/ha

Siarczan magnezu w dawce 7 kg/ha (zawiera tylko magnez).