



## **Komunikat sadowniczy SKS 10, 2015-05-15**

### **PARCZ JABŁONI**

W wielu rejonach w ciągu najbliższych kilkunastu godzin prognozowane są infekcje średnie do bardzo wysokich. Do oceny lokalnej sytuacji należy wziąć pod uwagę obliczenia wg tabeli Millsa.

Zalecamy kontynuowanie ochrony zapobiegawczej za pomocą **Delanu 70WG** 0,5kg/ha lub produktami opartymi na kaptanie: **Kaptan Zaw. 50 WP** 3 kg/ha lub **Captan 80 WG** w dawce 1,9 kg/ha.

Jeżeli dojdzie do infekcji konieczny będzie zabieg interwencyjny. Przy niskich temperaturach zalecamy: **Batalion 450 SC 0,7 l/ha**, a w temperaturze powyżej 12°C **Score 250 EC 0,2 l/ha** lub **Cros 250 EC 0,2 l/ha**. Preparaty interwencyjne należy stosować w mieszaninach z środkami kontaktowymi.

### **PRZYMROZKI**

W najbliższej czasie ryzyko wystąpienia przymrozków jest bardzo duże. Po wystąpieniu przymrozków należy jak najszybciej zadbać o pełną regenerację uszkodzonych tkanek po zaistniałym stresie. Należy wykonać oprysk produktem aminokwasowym wraz z łatwo przyswajalnym wieloskładnikowym nawozem. Polecamy zabieg **Megafol** (2,5 l/ha) łącznie z **Plantafolem 20.20.20**.

Megafol wyprodukowany jest na bazie ekstraktów roślinnych, dzięki czemu jego składniki lepiej wkomponowują się w struktury komórek roślinnych w porównaniu do podobnych produktów zawierających aminokwasy pochodzenia zwierzęcego.

Oprysk Megafolem przed wystąpieniem przymrozków poprawia kondycję roślin i podnosi ich odporność na uszkodzenia.

### **LUSTRACJE PO KWITNIENIU**

Po przekwitnięciu należy przeprowadzić lustrację w sadzie pod kątem obecności aktywnych plam parcha oraz szkodników głównie: mszyc, przędziorków i zwójkówek. Wiedza ta jest konieczna w celu podejmowania właściwych decyzji w ochronie.

SKS 10 2015 Parch: interwencyjnie: Batalion 0,7L/Score 0,2L; zapobiegawczo: Kaptan50 3kg Przymrozki: Megafol 2,5L+Plantafol 20.20.20

[http://zzowarka.pl/download/SKS\\_10\\_2015.pdf](http://zzowarka.pl/download/SKS_10_2015.pdf)