



Komunikat sadowniczy SKS XII 2014-05-09

PARCZ JABŁONI

Ostatnie opady nie wywołały silnych infekcji, zabiegi zapobiegawcze wykonane w ciągu ostatnich kilku dni powinny skutecznie przed nimi zabezpieczyć. Zalecamy kontynuowanie ochrony zapobiegawczej preparatami: Captan, Kaptan Zaw. lub Sadoplone, Thiram Granuflo, Pomarsol Forte, Antracol, Indofil, Dithane Neo Tec. Opady zapowiadane na najbliższe dni wywołają duże wysiewy zarodników i prawdopodobnie silną infekcję.

ZARAZA OGNIOWA

Symulacje komputerowe wskazują na wzrastające zagrożenie ze strony zarazy ogniowej, warto w tym momencie, tzn. zanim dojdzie do infekcji, wykonać zabieg prewencyjny jednym z zarejestrowanych preparatów miedziowych lub środkiem /Aliette Flash. Doświadczenia prowadzone w Belgii i Holandii wykazały, że preparaty fosforynowe (**Prevent P**) mają silne działanie ograniczające rozprzestrzenianie się zarazy ogniowej.

OWOCNICA JABŁKOWA

W sadach, w których w ubiegłym sezonie były objawy uszkodzeń na owocach wywołanych przez owocnicę warto wykonać zabieg zwalczający preparatami: Calypso lub Mospilan. Opryskiwać należy po przekroczeniu progu zagrożenia.

MIODÓWKA GRUSZOWA

Zalecamy wykonanie lustracji i w razie potrzeby wykonanie zabiegu zwalczającego preparatem Acaramik lub Movento.

MALINA – ZAMIERANIE PĘDÓW

Choroba ta w ostatnich latach czyni w malinach duże spustoszenie. Zalecamy opryskiwanie młodych przyrostów jednym z preparatów: Rovral Aquaflo, Sadoplone, Signum lub Switch.

SZARA PLEŚŃ - Truskawka

Truskawka gruntowa wchodzi w fazę kwitnienia. Zabiegi zwalczające szara pleśń w trakcie kwitnienia są bardzo ważne, ponieważ pozwalają uchronić owoce przed infekcjami. Zalecamy: preparaty zawierające Tiuram, Mythos, Signum, Rovral Aquaflo, Frupica, Grisul.

KWIECIAK MALINOWIEC

Na plantacjach truskawek kwieciek malinowiec powoduje duże szkody. Zalecamy wykonanie lustracji i w razie potrzeby wykonanie zabiegu jednym z pyretroidów: Decis Mega, Karate Zeon lub Mospilan.

PRZĘDZIORKI

Należy monitorować liczebność populacji przędziorków. W przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy opryskiwanie jednym z preparatów: Envidor, Sumo, Zoom.

USZKODZENIA PRZYMROZKOWE

W niektórych rejonach ostatnie spadki temperatur poniżej zera wywołały uszkodzenia, część zawiązków jest przemarznięta. Zalecamy racjonalne dokarmienie roślin, aby wspomóc regenerację uszkodzonych zawiązków. Na uszkodzonych kwaterach zalecamy zastosować nawóz Plantafole 20.20.20 (2-3 kg/ha) wraz z Megafolem (2,5 l/ha). Tam gdzie jakość liści jest słaba zalecamy opryskiwanie Tecnokele Amino Mix (2-3 l/ha).